

## ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β'

14 ΜΑΪΟΥ 2011

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

### ΘΕΜΑ Α

- A1.** Θεωρία, σελ. 152 σχολικού βιβλίου.
- A2.** Θεωρία σχολικού βιβλίου. Δύο ενδεχόμενα  $A, B$  ενός δειγματικού χώρου  $\Omega$  λέγονται ασυμβίβαστα όταν  $A \cap B = \emptyset$ .
- A3.** Θεωρία, σελ. 65 σχολικού βιβλίου. Η σχετική συχνότητα  $f_i$  μιας παρατήρησης  $x_i$  ενός δείγματος, προκύπτει από το λόγο  $f_i = \frac{v_i}{n}$ , όπου  $v_i$  είναι η συχνότητα της παρατήρησης  $x_i$  προς το μέγεθος  $n$  του δείγματος. Έτσι, αν πολλαπλασιαστεί επί 100 εκφράζει την ποσοστιαία εμφάνιση της παρατήρησης  $x_i$ , σε σχέση με το μέγεθος του δείγματος  $n$ .
- A4.** α) Λ, β) Λ, γ) Σ, δ) Λ, ε) Σ.

### ΘΕΜΑ Β

- B1.** Έστω  $N(A), N(B), N(M)$  τα πλήθη αντίστοιχα των άσπρων ( $A$ ), κόκκινων ( $K$ ) και μαύρων ( $M$ ) σφαιρών. Επειδή  $P(M) = \frac{1}{4}$ , θα είναι:  $\frac{N(M)}{N(\Omega)} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow N(\Omega) = 4 \cdot N(M)$ .
- Το πλήθος  $N(M)$  όμως είναι φυσικός αριθμός, άρα:  $N(\Omega) = \text{πολ}4 = 4\kappa, \kappa \in \mathbb{N}^*$ .
- Αφού  $64 < N(\Omega) < 72$  έπεται  $64 < 4\kappa < 72 \Leftrightarrow 16 < \kappa < 18$ . Αφού  $\kappa$  φυσικός έπεται  $\kappa = 17$ .
- Άρα  $N(\Omega) = 4 \cdot 17 = 68$ .
- B2.** Είναι  $A \cup M \cup K = \Omega$ , άρα  $P(A \cup M \cup K) = P(\Omega) = 1$  (1), με  $A \cap M = \emptyset, A \cap K = \emptyset, M \cap K = \emptyset$ , δηλαδή τα  $A, M, K$ , είναι ανά δύο ασυμβίβαστα.
- Έτσι η (1) γράφεται  $P(A) + P(M) + P(K) = 1$ .
- Προκύπτει έτσι  $\frac{1}{4} + 4\lambda^2 - 5\lambda + \frac{7}{4} = 1 \Leftrightarrow 4\lambda^2 - 5\lambda + 1 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 1$  ή  $\lambda = \frac{1}{4}$ .
- Για  $\lambda = 1$  προκύπτει  $P(A) = 4$ , οπότε η τιμή  $\lambda = 1$  απορρίπτεται διότι  $0 \leq P(A) \leq 1$ .
  - Για  $\lambda = \frac{1}{4}$  προκύπτει  $P(A) = \frac{1}{4}, P(K) = \frac{1}{2}, P(M) = \frac{1}{4}$ . Άρα η τιμή  $\lambda = \frac{1}{4}$  είναι η ζητούμενη.

**B3.**  $P(M) = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \frac{N(M)}{N(\Omega)} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow N(M) = \frac{1}{4} \cdot N(\Omega) = \frac{1}{4} \cdot 68 = 17.$

Επίσης,  $P(A) = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \frac{N(A)}{N(\Omega)} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow N(A) = \frac{1}{4} \cdot N(\Omega) = \frac{1}{4} \cdot 68 = 17.$

$P(K) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{N(K)}{N(\Omega)} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow N(K) = \frac{1}{2} N(\Omega) = \frac{1}{2} \cdot 68 = 34.$

**B4.** Έστω  $A$  το ενδεχόμενο να επιλεγεί άσπρη σφαίρα και  $M$  το ενδεχόμενο να επιλεγεί μαύρη σφαίρα. Ζητείται η πιθανότητα του ενδεχομένου  $A \cup M$ . Επειδή τα  $A, M$  είναι

ασυμβίβαστα, είναι:  $P(A \cup M) = P(A) + P(M) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$

### ΘΕΜΑ Γ

**Γ1.** Έχουμε:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^7 x_i f_i = 8 \cdot 0 + 10 \cdot 0,1 + 12 \cdot 0,2 + 14 \cdot y_{\Delta} + 16 \cdot y_E + 18 \cdot 0,1 + 20 \cdot 0$$

Επειδή  $\bar{x} = 14,2$  θα έχουμε:


$$14,2 = 1 + 2,4 + 30y_{\Delta} + 1,8 \Leftrightarrow \quad (\text{αφού } y_{\Delta} = y_E)$$

$$14,2 - 5,2 = 30 y_{\Delta}$$

$$y_{\Delta} = \frac{9}{30} = 0,3.$$

Άρα:  $y_{\Delta} = y_E = 0,3$

**Γ2.** Έχουμε:



Γ3. Είναι:

| [- )    | $x_i$ | $f_i$ % |
|---------|-------|---------|
| 9 - 11  | 10    | 10      |
| 11 - 13 | 12    | 20      |
| 13 - 15 | 14    | 30      |
| 15 - 17 | 16    | 30      |
| 17 - 19 | 18    | 10      |
| Σύνολο  |       | 100     |

Γ4. Σύμφωνα με τον πίνακα του ερωτήματος Γ3, το ποσοστό των πωλητών που θα λάβουν το επιπλέον εφάπαξ ποσό θα είναι 40%.

Γ5. Ο αριθμός των πωλητών που δικαιούνται το εφάπαξ ποσό, που αναφέρεται στο ερώτημα Γ4, θα είναι:  
 $80 \cdot 40\% = 32$ .

### ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Η συνάρτηση  $f$  είναι παραγωγίσιμη στο  $\mathbb{R}$  ως σύνθεση παραγωγίσιμων συναρτήσεων, με

$$f'(x) = \left[ e^{\frac{1}{3}x\left(x^2 - \frac{11}{10}x + \frac{2}{5}\right)} \right]' = e^{\frac{1}{3}x\left(x^2 - \frac{11}{10}x + \frac{2}{5}\right)} \left[ \frac{1}{3} \left( x^3 - \frac{11}{10}x^2 + \frac{2}{5}x \right) \right]'$$

$$= e^{\frac{1}{3}x\left(x^2 - \frac{11}{10}x + \frac{2}{5}\right)} \left[ \frac{1}{3} \left( 3x^2 - \frac{11}{5}x + \frac{2}{5} \right) \right] = e^{\frac{1}{3}x\left(x^2 - \frac{11}{10}x + \frac{2}{5}\right)} \left( x^2 - \frac{11}{15}x + \frac{2}{15} \right)$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow e^{\frac{1}{3}x\left(x^2 - \frac{11}{10}x + \frac{2}{5}\right)} \cdot \left( x^2 - \frac{11}{15}x + \frac{2}{15} \right) = 0 \Leftrightarrow (\text{αφού } e^{\frac{1}{3}x\left(x^2 - \frac{11}{10}x + \frac{2}{5}\right)} \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R})$$

$$x^2 - \frac{11}{15}x + \frac{2}{15} = 0 \Leftrightarrow 15x^2 - 11x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{3} \quad \text{ή} \quad x = \frac{2}{5}.$$

Προκύπτει έτσι ο επόμενος πίνακας μεταβολών:

| x    | $-\infty$  | $1/3$       | $2/5$      | $+\infty$   |   |
|------|------------|-------------|------------|-------------|---|
| $f'$ | +          | $\emptyset$ | -          | $\emptyset$ | + |
| $f$  | $\nearrow$ |             | $\searrow$ | $\nearrow$  |   |

Επομένως η  $f$  είναι:

- γνησίως αύξουσα στο διάστημα  $\left(-\infty, \frac{1}{3}\right]$ ,
- γνησίως φθίνουσα στο διάστημα  $\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{5}\right]$ ,
- γνησίως αύξουσα στο διάστημα  $\left[\frac{2}{5}, +\infty\right)$ ,

και παρουσιάζει

- τ. μέγιστο στη θέση  $x_1 = \frac{1}{3}$
- τ. ελάχιστο στη θέση  $x_2 = \frac{2}{5}$ .

Είναι:

- $v_1 = 2 \cdot x_1 + 1 = 2 \cdot 0 + 1 = 1$ .
- $v_2 = 2 \cdot x_2 + 2 = 2 \cdot 2 + 1 = 5$ .
- $v_3 = 2 \cdot x_3 + 2 = 2 \cdot 3 + 1 = 7$ .

Έτσι προκύπτει ο παρακάτω πίνακας κατανομής συχνοτήτων:

| $x_i$     | $v_i$     | $x_i v_i$ |
|-----------|-----------|-----------|
| $x_1 = 0$ | $v_1 = 1$ | 0         |
| $x_2 = 2$ | $v_2 = 5$ | 10        |
| $x_3 = 3$ | $v_3 = 7$ | 21        |
|           | $v = 13$  |           |

$$\text{Άρα } \bar{x} = \frac{0+10+21}{13} = \frac{31}{13}.$$

**Δ2.** Είναι  $A \subseteq B$  άρα  $P(A) \leq P(B)$ , οπότε  $P(A) = \frac{1}{3}$  και  $P(B) = \frac{2}{5}$ .

Ακόμα, επειδή  $A \subseteq B \Rightarrow A \cap B = A$ .

Οπότε:

- $P(A \cap B) = P(A) = \frac{1}{3}$ .
- $P(A - B) = P(A) - P(A \cap B) = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0$ .

- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{3} + \frac{2}{5} - \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$ .
- $P(B - A) = P(B) - P(A \cap B) = \frac{2}{5} - \frac{1}{3} = \frac{1}{15}$ .

**$\Delta 3.$**   **$\alpha)$**   $f(x) = h(x) \Leftrightarrow e^{\frac{1}{3}x(x^2 - \frac{11}{10}x + \frac{2}{5})} = e^{\frac{1}{5}x(\frac{3x^2}{2} - x - \frac{1}{3})} \stackrel{e^x = 1-1}{\Leftrightarrow}$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{3}x(x^2 - \frac{11}{10}x + \frac{2}{5}) = \frac{1}{5}x(\frac{3x^2}{2} - x - \frac{1}{3}) \Leftrightarrow 5x(x^2 - \frac{11}{10}x + \frac{2}{5}) = 3x(\frac{3x^2}{2} - x - \frac{1}{3}) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 5x(x^2 - \frac{11}{10}x + \frac{2}{5}) - 3x(\frac{3x^2}{2} - x - \frac{1}{3}) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x(5x^2 - \frac{11}{2}x + 2 - \frac{9x^2}{2} + 3x + 1) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x(\frac{1}{2}x^2 - \frac{5x}{2} + 3) = 0 \Leftrightarrow x(x^2 - 5x + 6) = 0 \Leftrightarrow x_1 = 0, x_2 = 2, x_3 = 3.$$